



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • B.P. 19 • 31131 BALMA CEDEX
Tél. Standard : 61.24.70.70 - Technique : 61.24.70.33
Abonnement : 61.24.70.30

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Régisseur de Recettes
D.R.A.F. "MIDI-PYRÉNÉES"
CCP : 8618-62 Y Toulouse
I.S.S.N. : 0752-2053

ABONNEMENT ANNUEL : 170 F.

BULLETIN N° 10 DU 6 JUIN 1991

TOURNESOL

PHOMOPSIS

Situation

Aucune sortie d'ascospore n'a été observée durant la période du 20 au 31 mai dans le réseau de pièges.

De faibles projections viennent d'être observées lors de la dernière pluie du 1^{er} juin.

Préconisation

• Parcelles précoces

- Traitées (suite à notre conseil du bulletin n° 9 du 24 mai) :

Il est inutile de renouveler une application.

- Non traitées :

• Variétés tolérantes : *il est inutile d'intervenir.*

• Variétés traditionnelles : *une intervention est conseillée au stade limite de passage avec le tracteur. Utiliser l'un des produits autorisés pour lutter contre le phomopsis (cf. bulletin n° 3 du 28 février 1991).*

• Parcelles tardives, au stade 2 à 6 feuilles

Attendre pour intervenir. De nouveaux conseils seront donnés dans notre prochain bulletin.

BLE

Stades

végétatifs

Floraison en cours. Stade 10-5-1 à 10-5-4.

MALADIES DU FEUILLAGE

Situation

Dans le réseau d'observation, sont signalés sur les derniers étages foliaires :

- l'Oïdium dans près de 50 % des parcelles,
- la Rouille brune et la Septoriose dans un faible nombre de situations.

Pas de nouveau cas de Rouille jaune constaté.

Préconisation

Les traitements ont dû être réalisés (cf. nos conseils du dernier bulletin n° 9 du 24 mai). Dorénavant, aucun nouveau traitement fongicide ne se justifie pour cette campagne.

PUCERONS SUR EPIS

Situation

Leur présence est notée dans près d'un tiers des parcelles. En moyenne, 10 % des épis sont colonisés dans ces situations.

Préconisation

Surveiller leur progression. Une intervention n'est justifiée qu'à partir d'1 épi sur 2 colonisés dans une parcelle.

En cas de traitement, utiliser l'un des produits efficaces contre les pucerons sur épi indiqués dans le dépliant adressé le 20 mars 1991.



MAIS

Stades végétatifs

Ils sont très variables. Ils s'étalent de 2 feuilles à 6-8 feuilles selon les dates de semis.

SESAMIE

Situation

Le vol de papillons de la première génération est maintenant étendu à l'ensemble de la région (captures quasi généralisées dans le réseau de pièges et début du vol en cage d'élevage à BALMA le 26 mai).

Les premières pontes ont été observées au milieu de la semaine du 27 au 30 mai.

Préconisations

Valables pour les cultures de maïs semence ainsi que pour toutes les parcelles de maïs consommation régulièrement attaquées par la sésamie lors des dernières campagnes agricoles.

Dans les 2 cas ci-après, fractionner le produit en deux demi-doses en espaçant les applications de 15 jours.

• Maïs actuellement à 6 feuilles au minimum

- . La première intervention sera à réaliser en fin de semaine, soit vers le 7 juin.
- . La deuxième intervention devra être réalisée vers le 21 juin.

• Maïs actuellement à 2 feuilles

Retarder les interventions d'une semaine.

- . Première intervention : période du 12 au 14 juin.
- . Deuxième intervention : période du 26 au 28 juin.

Utiliser un produit indiqué dans le dépliant "Protection du Maïs" - rubrique SÉSAMIE - 1^{ERE} GENERATION - adressé avec notre bulletin n° 5 du 28 mars 1991.